

Das Leben in den grössten Meerestiefen

Ernst Heinrich Philipp August Haeckel

BOSTON MEDICAL
★ NOV 20 1964 ★
LIBRARY
t.6082

Digitized by Google

Digitized by Google



E. Haeckel del.

Wagenschieber sc.

Digitized by Google

Das

Leben in den grössten Meerestiefen.

Von

Dr. Ernst Haeckel,
Professor in Jena.

Vortrag, gehalten am 2. März 1870 im akademischen Rosensaale zu Jena.

Mit 1 Titelbild in Kupferstich und 3 Holzschnitten.

Berlin, 1870.
C. G. Lüderitz'sche Verlagsbuchhandlung.
A. Charisius.

Digitized by Google

Das Recht der Ueberſetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Digitized by Google

In den letzten dreizehn Jahren haben die Regierungen von England, von Schweden und von den vereinigten Staaten eine Anzahl von Kriegsschiffen für einen Zweck ausgerüstet, der früher niemals ein Arsenal in Bewegung gesetzt hat. Es galt dabei weder eine kriegerische noch eine diplomatische Mission. Auch handelte es sich nicht um eine von jenen zahlreichen und berühmten Entdeckungs-Reisen, durch welche insbesondere die englische Marine sich um unsere Kenntniß ferner Erdtheile und ihrer Bewohner so hoch verdient gemacht hat. Der Zweck dieser Expeditionen war vielmehr ein ganz anderer und neuer. Es sollten in großartigem Maaßstabe genaue Untersuchungen über die Beschaffenheit des Meeresbodens in den größten Tiefen des Oceans, und über die Spuren von organischem Leben, die etwa dort zu finden seien, angestellt werden.

Die erste Veranlassung zu diesen Untersuchungen gab der elektrische Draht, welcher seit vier Jahren, die Schranken von Raum und Zeit überspringend, Europa und Amerika in den unmittelbarsten geistigen Verkehr gesetzt hat. Um dieses Telegraphen-Kabel legen zu können, mußte zuvor der Grund des atlantischen Oceans bezüglich seiner Tiefe und Bodenbeschaffenheit auf das genaueste geprüft und ausgemessen werden. Als

Digitized by Google

nun im Jahre 1857 das englische Kriegsschiff Cyclops unter dem Kommando von Capitän Dayman diese Prüfung ausführte, stieß man auf lebendige Thiere in Meerestiefen, die man bis dahin für gänzlich todt und entblößt von allem vegetabilischen und thierischen Leben gehalten hatte. Auch ergab sich bei mikroskopischer Untersuchung des feinen Schlammes, der jene Tiefen bedeckt, daß derselbe zum großen, ja oft zum größten Theile aus zahllosen kleinen Organismen zusammengesetzt sei. Diese überraschende Thatsache regte zu einer eingehenden Untersuchung aller Verhältnisse der größten Meerestiefen und ihrer lebendigen Bewohner an, und führte zu den interessanten Resultaten, von denen mein Vortrag in gedrängter Kürze Bericht abstatten soll.

Die Verbreitung dieser Resultate in weiteren Kreisen erscheint nicht bloß wegen der wichtigen allgemeinen Folgerungen wünschenswerth, die sich daran knüpfen lassen, sondern auch deßhalb, weil sie geeignet sind, lebhafteres Interesse für die außerordentlich interessante Gruppe der niederen Seethiere zu erwekken. Im Ganzen ist unsere nähere Kenntniß von den lebendigen Bewohnern des Meeres überhaupt noch sehr jungen Alters. Obgleich schon Aristoteles, 350 Jahre vor Christi Geburt, in seiner berühmten Naturgeschichte den Seethieren besondere Aufmerksamkeit gewidmet und viele merkwürdige Thatsachen aus ihrem Leben mitgetheilt hatte, blieb dennoch mehr als zwei Jahrtausende hindurch das Interesse an diesen Geschöpfen fast ganz erloschen. Auch der neu belebte Eifer, mit dem im vorigen Jahrhundert die Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen wieder in Angriff genommen wurde, berührte die Bevölkerung des Meeres im Ganzen nur wenig. Die vorzugsweise das feste Land bewohnenden Thiere und Pflanzen, namentlich die großen Säugethiere und Vögel, und unter den kleineren Thieren die Insecten, nahmen die Aufmerksamkeit ganz vorwiegend für sich in An-

Digitized by Google

ſpruch. Erſt in unſerem Jahrhundert wandte ſich die Wißbegierde der Naturforſcher auch den vernachläſſigten Meeresbewohnern wieder zu und wurde bald durch eine Fülle der überraſchendſten Entdeckungen belohnt. Insbeſondere in den letzten dreißig Jahren ſind alljährlich Zoologen und Botaniker, mit Mikroſkop, Netz und anatomiſchem Beſteck bewaffnet, an die Meeresküſte gezogen, und haben die biologiſche Wiſſenſchaft mit einem wahren Schatze intereſſanter Thatſachen bereichert. Die früher kaum dem Namen nach gekannten Abtheilungen der Wurzelfüßer, Meduſen, Sternthiere, und viele andere niedere Thiergruppen des Oceans ſtehen in Bezug auf Mannichfaltigkeit und Reiz der Formen und Lebenserſcheinungen den landbewohnenden Inſecten und Wirbelthieren keineswegs nach; ſie übertreffen dieſelben ſogar in vieler Beziehung. Auch ſind von den ſieben großen Hauptabtheilungen, in welche die neuere Zoologie das Thierreich eintheilt, nicht weniger als vier zum größten Theile auf das Meer beſchränkt; eine derſelben lebt ausſchließlich im Meere (die Sternthiere oder Echinodermen); und nur zwei Abtheilungen, die Wirbelthiere und Gliederthiere, bilden jenen gegenüber die ganz überwiegende Bevölkerung des Feſtlandes. Für die wiſſenſchaftliche Zoologie aber, welche nach einem wahren Verſtändniß der Erſcheinungen und nach den bewirkenden Urſachen der biologiſchen Thatſachen ſtrebt, muß die Kenntniß gerade der niederen Seethiere um ſo höhere Bedeutung beanſpruchen, als dieſe letzteren vorzugsweiſe geeignet ſind, uns zur Löſung der größten biologiſchen Räthſel zu führen. Was das Leben iſt, wie es entſtand, wie es ſich entwickelt hat, das lehren uns grade die niederſten und unvollkommenſten Bewohner der Meerestiefen; unter ihrer geheimnißvollen Schaar ſind auch die Wurzeln der höher entwickelten Thiergruppen verborgen, die uralten Stammformen, aus denen die letzteren ſich wahrſcheinlich entwickelt haben.

Digitized by Google

Der allergrößte Theil unserer Kenntnisse vom Leben des Meeres beruhte übrigens bis vor wenigen Jahren fast nur auf denjenigen Beobachtungen, welche an den Bewohnern der Küsten und der Oberfläche des Meeres angestellt worden waren. In größere Tiefen war die biologische Forschung bis vor zwanzig Jahren noch nicht vorgedrungen. Es herrschte sogar fast ganz allgemein die Ansicht, daß der Reichthum und die Mannichfaltigkeit der Pflanzen- und Thier-Bevölkerung nur an den Küsten bis in sehr geringe Tiefen hinab zu finden sei, und daß mit zunehmender Tiefe das Leben rasch abnehme und endlich vollständig aufhöre. Man glaubte, daß der ungeheure Druck der Wassersäule, der völlige Mangel an Licht, die fehlende Wasserbewegung und andere Verhältnisse der größeren Meerestiefen jede Entwickelung von thierischem und pflanzlichem Leben verhindere und ausschließe.

Allerdings konnte diese Vorstellung ganz gerechtfertigt erscheinen, angesichts der gewaltigen Verschiedenheit, welche die Existenzbedingungen in den größeren Meerestiefen wirklich darbieten. In unseren Meeren ist schon bei 150 Fuß Tiefe das helle Tageslicht in rothgelbe Dämmerung umgewandelt Schon bei 600 Fuß Tiefe herrscht absolute Dunkelheit. In weniger als tausend Fuß Tiefe ist auch in den klarsten Meeren und bei dem blendendsten Schein der Tropensonne jede Spur eines Lichtschimmers verschwunden. Wenn man nun bedenkt, wie wichtig das Licht für das organische Leben, namentlich der Pflanzen ist, wie ohne dasselbe keine Farbe existirt, so wird man schon aus diesem Grunde die ewige Nacht der tiefen Abgründe für absolut lebensfeindlich halten. Dazu kommt die niedere Temperatur des Wassers in den größeren Tiefen. Obgleich die Angaben der verschiedenen Beobachter hierüber sehr abweichen, so stimmen doch alle darin überein, daß überall in den bedeutenderen Tiefen, min-

Digitized by Google

deſtens unterhalb 3000 Fuß, die Waſſer-Temperatur entweder auf dem Gefrierpunkt oder doch dieſem ſehr nahe ſteht. Es ſcheint ſogar, daß in den tieferen Abgründen, unterhalb 10,000 Fuß, das Waſſer eine Temperatur unter Null beſitzt, ohne zu gefrieren.

Die eigenthümlichſte Exiſtenzbedingung jedoch, welcher die Organismen in größeren Meerestiefen ausgeſetzt ſind, iſt der ungeheure Druck der auf ihnen laſtenden Waſſerſäule. Dieſer beträgt bereits in einer Tiefe von Eintauſend Fuß 313 Atmoſphären, demnach in 20,000 Fuß 6260 Atmoſphären. Wyville Thomſon giebt davon ein anſchauliches Bild, indem er bemerkt: „Ein Mann in der Tiefe einer engliſchen Meile trägt auf ſeinem Körper ein Gewicht gleich demjenigen von zehn gewöhnlichen Güterzügen, die mit Eiſenſchienen beladen ſind. Da nun eine engliſche Meile etwas über 5000 Fuß lang iſt, die tiefſten gemeſſenen Abgründe aber über ſechs engliſche Meilen tief ſind, ſo würde ein Menſch auf dem Boden dieſer Abgründe einen Druck auszuhalten haben, welche demjenigen von ſechzig ſolcher mit Eiſen beladenen Güterzüge gleich iſt. Genauer ausgedrückt iſt in 32,000 Fuß Tiefe der Druck gleich tauſend Atmoſphären. Jede Atmoſphäre laſtet aber auf einem Quadratfuß Bodenfläche mit einem Gewicht von 2176 Pfund. Es war demnach gewiß ſehr natürlich, daß man die Exiſtenz organiſchen Lebens unter einem ſolchen Drucke bezweifelte. Dieſe Zweifel ſchienen ihre feſte Begründung durch die Unterſuchungen des Engländers Edward Forbes zu gewinnen, des erſten Naturforſchers, welcher mittelſt des Schleppnetzes oder der Dredge die genauere Erforſchung der Fauna und Flora in verſchiedenen Meerestiefen unternahm. Forbes wies nach, daß ſich die Thier- und Pflanzenbevölkerung der Küſten beim Hinabſteigen in die Tiefe ebenſo zonenweiſe verändere, wie die Fauna und Flora der Gebirge beim Hinaufſteigen in die Höhe. Anderen Tiefenzonen

Digitized by Google

entsprechen andere organische Formen. Demgemäß theilte Forbes die submarine Küstenabdachung in eine Anzahl von mehreren horizontalen, übereinander liegenden Zonen oder Tiefengürteln. Die letzte und tiefste von diesen Zonen sollte zwischen 100 und 300 Faden (600 und 1800 Fuß) liegen. Das organische Leben sollte innerhalb derselben immer mehr abnehmen. Die Pflanzen sollten schon bei 1400, die Thiere bei 1800 Fuß Tiefe völlig aufhören und in den Tiefen unterhalb zweitausend Fuß sollte alles organische Leben erloschen sein.

Diese Angaben von Forbes erwarben sich fast allgemeine Annahme. Aber auf unvollkommene Methoden der Untersuchung und auf unvollständige Beobachtungsreihen gegründet, haben sie sich jetzt als vollständig unrichtig herausgestellt. Die vorher erwähnten Tiefgrund-Untersuchungen des atlantischen Oceans, welche mit vervollkommneten Instrumenten und besseren Methoden ausgeführt wurden, haben im Gegentheil ergeben, daß das organische Leben in massenhafter Entwickelung von zahllosen Individuen (wenn auch nur in wenigen verschiedenen Formen) sich bis in die tiefsten Abgründe des Oceans hinaberstreckt. Diese Abgründe erreichen zum Theil eine Tiefe, welche größer ist, als die Höhe der höchsten Gebirge über dem Meeresspiegel. Im nördlichen atlantischen Ocean haben die Messungen der letzten Jahre Tiefen von 25,000—28,000 Fuß erreicht. Ja in einigen Fällen hat das Senkloth bei 32,000 Fuß noch keinen Grund gefunden. Der Himalaya, das höchste Gebirge unserer Erde, könnte in diesen Tiefen auf dem Meeresboden begraben liegen, und unsere größten Schiffe könnten über seine höchsten Spitzen hinwegfahren, ohne sie zu berühren.

Die genaue Untersuchung dieser ungeheuren Abgründe und der lebendigen Bewohner, die dort unten begraben sind, ist selbstverständlich sehr schwierig, und hierin liegt auch die Entschuldigung

Digitized by Google

dafür, daß sie uns erst in den letzten Jahren besser bekannt geworden sind. Sie kann gar nicht verglichen werden mit der verhältnißmäßig leichten Untersuchung des Küstenbodens von geringer Tiefe. Dieser letztere kann am besten und vollständigsten in der Taucherglocke untersucht werden. Jedoch sind die Spaziergänge und Excursionen, welche man in der Taucherglocke auf dem Meeresboden anstellen kann, bei der unvollkommenen Ausbildungsstufe dieses wichtigen Instrumentes immerhin etwas mißlich und gefährlich. Selbst der eifrigste Naturforscher entschließt sich dazu nur schwer. Man wendet deßhalb zur zoologischen Ausbeutung des Meeresbodens in geringeren Tiefen gewöhnlich das Schleppnetz oder Scharrnetz an (auch Drague oder Dragge, Dredge oder Dredsche genannt). Das ist ein einfaches Gerüst von zwei oder drei starken Eisenstäben, welche am einen Ende an einem Tau befestigt, am anderen Ende dagegen fest mit einem eisernen Rahmen verbunden sind. Dieser letztere kratzt mit seiner scharfen Schneide messerartig den Meeresboden ab, wenn das Netz niedergesunken ist und nun am Tau fortgezogen wird. Alles, was da unten wächst und kriecht, wird so zusammen gescharrt, und fällt bunt durcheinander in einen Sack von grober Leinwand oder starkem Netzwerk, dessen Mündung an dem eisernen Rahmen befestigt und ausgespannt ist. Gewöhnlich wirft man das Netz vom Boot aus in die blaue Tiefe, rudert dann eine Strecke weit fort, während das Netz am Taue nachgezogen wird, und windet nach einiger Zeit das Netz am Tau herauf. Die abgekratzte Decke des Meeresbodens wird dann aus dem Sack des Netzes in das Boot geschüttet und durchmustert.

Diese Plünderung des Meeresbodens mit dem Schleppnetz oder der Dredsche ist ein Jagdvergnügen von ganz eigenem Reize, wenn auch oft Geduld und Kräfte stark auf die Probe gestellt werden. Die neugierige Spannung, was wohl für kostbare

Digitized by Google

Schätze aus der verborgenen Tiefe das aufs Gerathewohl ausgeworfene Netz heraufziehen möge, ist groß; sie wächst mit den Anstrengungen, welche die schwere Arbeit des Dredschens erfordert. Die Aufregung und der Eifer des dredschenden Zoologen sind nicht geringer, als die des californischen Goldgräbers. An manchen Tagen ist der Ertrag des Schleppnetzes so reich, daß alle mitgenommenen Eimer, Büchsen und Gläser nicht genügen, um die erbeuteten Schätze aufzunehmen. An andern Tagen ist alle Mühe vergebens aufgewendet, und mißmuthig, enttäuscht und ermüdet kehrt man am Abend mit leeren Händen heim. Schon als ich vor elf Jahren in Neapel und Messina dredschte, habe ich diese Leiden und Freuden der Schleppnetzfischerei reichlich gekostet, und nicht minder im vorigen Sommer, wo ich mehrere Wochen die norwegische Küste bei Bergen mit der Dredsche absuchte. Bisweilen zog ich hier das Netz so schwer gefüllt empor, daß ich hoffte, alle meine Gläser mit Thieren füllen zu können, und wenn der Sack des mühsam heraufgewundenen Netzes ausgeschüttet wurde, rollten Nichts als Steine heraus. Andere Male glaubte ich das Netz fast leer heraufzuziehen, und als es über Wasser erschien, überraschte mich der Anblick einer prachtvollen Koralle oder Seerose, einer zierlichen Seelilie oder eines herrlichen Seesterns. Eines Tages hatte ich mich mit Absuchen eines Fjordes in der Nähe von Bergen den ganzen Tag über in strömendem Regen umsonst geplagt. Als ich endlich am Abend ermüdet und entmuthigt nach Hause fuhr, fiel es mir beim Herausrudern aus der Einfahrt des Fjords ein, in dieser schmalen Meeresenge noch einen letzten Versuch zu machen. Das Schleppnetz wurde noch ein Mal ausgeworfen und schwer gefüllt heraufgewunden; und siehe da: beim Ausschütten des Sackes füllte sich das ganze Boot mit den herrlichsten Schätzen: prächtige purpurrothe Seesterne von mehr als einem Fuß Durchmesser, stache-

Digitized by Google

lige Seeigel von der Größe eines Kindeskopfes, schwarze große Seegurken, zarte weiße Seelilien mit gefiederten Armen, dünne langbeinige Seespinnen und feiste wohlgenährte Krabben, dazwischen große bunte Ringelwürmer, ungeheuer lange Schnurwürmer, prächtige Muscheln und Schnecken, Alles kroch und krabbelte in bunten Haufen durcheinander!

Wenn übrigens das Schleppnetz nicht sehr klein ist, so erfordert sein Gebrauch viel Umsicht und Anstrengung. Mit großer Sorgfalt muß man auf Lage und Bewegung des Netzes achten, welche durch eine auf dem Wasser schwimmende Boie angezeigt wird. Die Boie ist ein leichtes Stück Holz oder Kork, das mittelst einer besonderen Leine am Netzbügel befestigt ist. Oft bleibt das Netz zwischen Steinen und Klippen hängen, und kann nur mit großer Mühe wieder flott gemacht werden. Nicht selten geht es dabei ganz verloren. Das Heraufwinden des Netzes, wenn es mit ein paar Centner Steinen erfüllt ist, erfordert in einem kleinen Boote mit wenig Mannschaft große Vorsicht und vielen Kraftaufwand.

Für die Untersuchung der größeren Tiefen genügt ein so einfaches Schleppnetz natürlich nicht. Da ist ein sehr complicirter Apparat von Tauen, Netzen, Lothen, Winden und anderen Instrumenten erforderlich. Am unteren Ende der Senkleine, welche eine Länge von 20,000—24,000 Fuß haben muß, wird ein Senkloth von sehr sinnreicher Construction befestigt. Die neueste Erfindung der Art, von Fitzgerald, macht es möglich, einen kleinen Eimer voll Schlamm aus den größten Tiefen zu holen. Um mit einem solchen Senkloth die tiefsten Abgründe des Meeres zu sondiren, ist ein großes Schiff mit zahlreicher Mannschaft nöthig. Wie schon erwähnt, haben die englische, die schwedische und die nordamerikanische Regierung zu diesem Zweck schon verschiedene Kriegsschiffe ausgesendet. Insbesondere

Digitized by Google

hat die englische Admiralität auf Antrag von Professor Carpenter im Sommer 1868 das Kanonenboot „Lightning“ und im Sommer 1869 ein größeres Kriegsschiff („Porcupine“, das Stachelschwein genannt) den dredschenden Zoologen zur Verfügung gestellt. Im letzten August traf ich zufällig in Bergen den Herrn Gwyn Jeffreys aus London, einen der eifrigsten Dredscher, der schon seit Jahren die Tiefen der Nordsee durchforscht hatte. Er theilte mir die Zeichnung und Beschreibung der Dredsche-Apparate mit, welche die Admiralität dem Kriegsschiff Porcupine mitgegeben hatte, und erregte dadurch meinen Neid und meine Bewunderung. Zu bewundern war auch hier, wie gewöhnlich bei ähnlichen Unternehmungen der Engländer, das praktische Geschick, die unermüdliche Energie und die verschwenderische Ausstattung mit allen möglichen Hülfsmitteln für diese rein wissenschaftliche Expedition. Zu beneiden waren die glücklichen Naturforscher, Professor Carpenter und Professor Wyville Thomson, denen solche reiche Mittel und solche unvergleichliche Gelegenheit geboten wurde.

Die wichtigsten Resultate nun, welche sich aus diesen Tiefgrund-Untersuchungen des letzten Decenniums, und vorzüglich aus den sehr ausgedehnten und sorgfältigen Beobachtungen der letzten beiden Jahren übereinstimmend ergeben haben, sind in Kürze, soweit sie sich bis jetzt sicher übersehen lassen, folgende: Die große Mannichfaltigkeit und Ueppigkeit des Thier- und Pflanzen-Lebens, welche man an den meisten Meeresküsten wahrnimmt, und welche an Formenreichthum die Festland-Bevölkerung weit übertrifft, beschränkt sich an den meisten Meeresküsten nicht auf geringe Tiefen, wie man früher annahm, sondern erstreckt sich in unverminderter Fülle wenigstens über 1000 Fuß Tiefe hinab, in vielen Fällen bis gegen 1500 und 2000 Fuß. Das Pflanzenleben, welches durch die formenreiche Klasse der Algen oder Tange in-

Digitized by Google

nerhalb der ersten fünfhundert Fuß so reich vertreten ist, scheint gewöhnlich schon bei eintausend Fuß Tiefe an Mannichfaltigkeit der Arten und Masse der Individuen stark abzunehmen. In Tiefen von 1200—1500 Fuß ist es nur noch sehr spärlich und wohl nur selten steigen einzelne niedere Tangarten unter 2000 Fuß hinunter. Das Thierleben dagegen erreicht wenigstens die doppelte verticale Ausdehnung in der Tiefe und geht in ansehnlichem Reichthum von Formen noch unter 3000 Fuß hinab.

Den norwegischen Fischern ist es schon seit langer Zeit bekannt, daß in einer Tiefe von 1500—2000 Fuß noch eine beträchtliche Anzahl von verschiedenen Fischen und Krebs-Arten lebt, zum Theil von ansehnlicher Größe. Unter diesen befinden sich sogar einige Fische, welche wegen ihres vortrefflichen Fleisches und der großen Menge, in der sie vorkommen, einen sehr geschätzten Handels-Artikel bilden. Das sind namentlich Fische aus der Familie der Gadoiden (Dorsche, Klippfische, Schellfische u. s. w.). Von diesen kommen z. B. der wohlschmeckende „Leng" (Molva vulgaris) und der über 4 Fuß lange, in noch größeren Tiefen lebende „Birkeleng" (Molva abyssorum), ferner der nahe verwandte „Brosme" (Brosmius brosme) in großer Menge auf den Fischmarkt von Bergen. Zu diesen Gadoiden gesellen sich in jenen nordischen Meerestiefen noch viele andere Fische, namentlich die ellenlangen, prachtvoll scharlachroth gefärbten Marulken (Sebastes norvegicus), deren Rückenstacheln die Eskimos als Nadeln benutzen; ferner ein im Eismeer allgemein verbreiteter Haifisch (Scymnus microcephalus), sowie verschiedene Arten aus der Familie der plattgedrückten Schollen oder Plattfische (Pleuronectides), jener merkwürdigen Fische, bei denen die beiden Augen auf einer Seite des plattgedrückten Körpers, entweder auf der rechten oder auf der linken liegen. Nur die Körperseite, auf welcher die beiden Augen liegen, ist gefärbt. Die

Digitized by Google

andere Seite, mit welcher sie flach auf dem Meeresboden liegen, ist farblos. Offenbar haben diese unsymmetrischen Schollen ihre sonderbare Körperform, durch die sie sich von allen anderen Fischen unterscheiden, durch die Gewohnheit erhalten, sich mit einer Seite, der rechten oder linken, flach auf den Meeresboden zu legen und dabei mit dem halbverdrehten Kopfe nach oben zu schielen. Durch diese eigenthümliche Anpassung ist im Laufe zahlreicher Generationen allmählich die ganze Form des Körpers, und namentlich des Kopfes, unsymmetrisch geworden, und hat sich dann durch Vererbung von der gemeinsamen Stammform der Pleuronectiden auf alle die zahlreichen Arten übertragen, in welche sich späterhin diese Fischfamilie gespalten hat. In frühester Jugend sind übrigens alle Schollen symmetrisch gebaut und erst im Laufe ihres Wachsthums und ihrer individuellen Entwickelung nehmen sie die schiefe und ganz unsymmetrische Gestalt an. Dieser wichtige Umstand erklärt sich aus unserem biogenetischen Grundgesetz[1]), daß die Ontogenesis oder die individuelle Entwickelung eine kurze und schnelle, durch die Gesetze der Anpassung und Vererbung bedingte Wiederholung der Phylogenesis, d. h. der paläontologischen Entwickelung der Vorfahren-Kette des betreffenden Individuums ist. Von den zahlreichen wohlschmeckenden Arten der Pleuronectiden, welche die nordischen Meere massenhaft bevölkern, und von denen namentlich die Steinbutten, Flundern und Seezungen als Delicatessen geschätzt werden, gehen vorzüglich drei Arten an der norwegischen Küste oft in beträchtliche Tiefen hinab: der Nordflunder (Platessa borealis), der Fettbutt (Hippoglossus pinguis) und der Heiligenbutt (H. maximus), welcher letztere eine Länge von fast 7 Fuß erreicht.

Da die meisten von diesen Fischen, welche noch in einer Tiefe von 2000 Fuß leben, große und gefräßige Fleischfresser sind, so läßt sich schon daraus schließen, daß eine entsprechend große

Digitized by Google

Menge von kleineren Thieren, die ihnen zur Nahrung dienen, ebendaselbst leben muß. Und in der That haben die darauf gerichteten neueren Untersuchungen des Tiefsee-Bodens, vorzüglich von norwegischen und schwedischen, sowie von englischen und nordamerikanischen Naturforschern, den sicheren Beweis geliefert, daß auch noch in Tiefen von 2000—3000 Fuß der Meeresboden, wenigstens an manchen Stellen, mit lebenden Thieren bedeckt ist. Insbesondere nehmen folgende Thierklassen an dessen Bevölkerung Theil: Schwämme und Korallen aus dem Stamm der Pflanzenthiere (Zoophyten oder Coelenteraten); Mantelthiere, Ringelwürmer und Sternwürmer aus dem Stamm der Würmer; Krebse oder Crustaceen aus dem Stamm der Gliederthiere oder Arthropoden. Auch verschiedene Arten von Weichthieren oder Mollusken, sowohl Muscheln und Taschen, als Schnecken und Kracken, werden mit jenen vermischt gefunden. Vorzüglich scheint aber der interessante Stamm der Sternthiere (Astroda oder Echinoderma) durch zahlreiche und interessante Formen in jenen größeren Meerestiefen vertreten zu sein. Alle vier Klassen der Sternthiere sind hierbei betheiligt: die Seesterne (Asterida), von deren scheibenförmigem Mittelkörper mehrere, gewöhnlich fünf lange Strahlen ausgehen; die Seelilien (Crinoida), deren blumenkelchähnlicher Körper durch einen langen Stiel am Meeresboden befestigt ist; die Seeigel (Echinida), bei welchen der kugelige oder scheibenförmige Körper dicht mit Stacheln bedeckt ist, und die nahverwandten Seegurken (Holothuriae), welche mit ihrem nackten, langgestreckt cylindrischen Körper äußerlich eher großen Würmern als echten Sternthieren gleichen.

Unter diesen schönen Sternthieren der Meerestiefen sind besonders zwei nordische Formen in mehrfacher Beziehung von hervorragendem Interesse, Brisinga und Rhizokrinus. Beide sind uns durch den berühmten norwegischen Naturforscher Michael

Digitized by Google

Sars näher bekannt geworden, dessen im letzten Herbste erfolgter Tod ein großer Verlust sowohl für die Wissenschaft im Allgemeinen, als auch im Besonderen für die Erforschung des Lebens in den größeren Meerestiefen war. Sars war ursprünglich Pfarrer auf der Insel Manger unweit Bergen, gewann aber durch die vieljährige Beschäftigung mit den niederen Seethieren eine solche Vorliebe für diese ebenso reizenden als interessanten Geschöpfe, daß er zu ihren Gunsten auf sein einträgliches Pfarramt verzichtete. Je tiefer er in das Leben der Medusen und Korallen, der Sternthiere und Seewürmer eindrang, desto mehr mußte er sich überzeugen, wie dieser unerschöpfliche und untrügliche Quell der natürlichen Offenbarung, und die daraus entspringende Naturreligion, in unlösbarem Widerspruch stehe mit dem Kirchenglauben und den mythologischen Offenbarungen der Schriftgelehrten und Pharisäer. So verzichtete denn der treffliche Sars auf seine Theologie, und um so lieber, als seine abergläubischen Pfarrkinder hinter dem vertrauten Umgange ihres Seelenhirten mit dem Seegewürm, dem nur mit Abscheu von ihnen betrachteten „Troll", eine unheimliche Hexerei witterten und selbst seine Entfernung verlangten. Sars wurde dann als Professor der Zoologie in Christiania angestellt und galt in Europa bald mit Recht als die erste Zierde der norwegischen Universität. In seinen letzten Lebensjahren wurde sein Interesse vorwiegend durch die wunderbaren Bewohner der Tiefe gefesselt, welche die schwarzen Abgründe des Meeres zwischen den Felsen-Labyrinthen der zerrissenen Westküste Norwegens bewohnen. Die zahllosen, tief eingeschnittenen Buchten und Fjorde, welche hier weit in das Land eindringen, die Myriaden von größeren und kleineren Inseln, welche längs dieses zerfetzten Küstensaumes ausgesäet sind, bieten der reichen Entwickelung des marinen Thierlebens ein außerordentlich günstiges Feld. Viele von diesen malerischen Fjorden

Digitized by Google

und Meerengen sind bei einer sehr geringen Breite, die kaum derjenigen eines großen Flusses gleichkommt, von sehr beträchtlicher Tiefe. Das Urgebirge, das an der norwegischen Westküste ungemein steil 2000—4000 Fuß hoch aus dem Meeresspiegel aufsteigt, erstreckt sich daselbst oft ebenso tief oder noch tiefer unter denselben hinab. An der Oberfläche erscheint das Wasser in Folge der massenhaft einströmenden Gebirgsbäche schwach gesalzen oder fast süß, und ist sehr arm an lebendigen Bewohnern. Die stark gesalzene Tiefe dagegen wimmelt von niederen Thieren. Im Jahre 1868 gab Sars ein Verzeichniß der wirbellosen Thiere, welche er an der norwegischen Küste in einer Tiefe zwischen 1200 und 2700 Fuß gesammelt hatte. Dasselbe enthält nicht weniger als 427 verschiedene Arten, nämlich 106 Krebsthiere, 133 Weichthiere oder Mollusken, 57 Ringelwürmer, 36 Sternthiere, 22 Pflanzenthiere und 73 Urwesen oder Protisten.

Mit besonderer Vorliebe wurde von Sars der Hardanger-Fjord untersucht, jener berühmte Fjord, der an landschaftlicher Schönheit alle anderen übertrifft, der mit den schönsten schweizerischen Alpenseen wetteifert, und wegen seiner herrlichen Buchten und Gebirgsstöcke, seiner großartigen Gletscher und Wasserfälle am meisten von Touristen besucht wird. In seinen Abgründen lebt die schöne und seltene Lima excavata, eine große Muschel mit schneeweißer, zierlich gerippter Schale und mit elegant gefranztem Mantelrand. In ihrer Gesellschaft findet sich die vorher erwähnte Brisinga endecacnemos, ein prachtvoller und sehr merkwürdiger Seestern, der bis jetzt nur im Hardanger-Fjord gefunden worden ist. Als ich im letzten August dort in der Nähe von Utne fischte, hatte ich die Freude, ein lebendes Exemplar dieses herrlichen Thieres, unmittelbar nachdem es aus 1200 Fuß Tiefe heraufgezogen war, bewundern zu können. Diese Brisinga hatte ungefähr eine Elle Durchmesser. Von einer klei-

Digitized by Google



Fig. 1. Brisinga endecacnemos, der elfarmige Seestern von Hardanger.

nen runden orangerothen Scheibe strahlen elf lange, sehr zierliche Arme aus, welche 13—14 mal so lang sind als der Durchmesser der Scheibe. Die Arme sind prächtig korallenroth mit perlfarbigen Rippen, und auf jeder Seite mit einer dreifachen Reihe von langen Stacheln bewaffnet. Jeder Arm hat die innere Organisation eines gegliederten Wurmes und eigentlich ist der ganze Seestern als ein Stock oder eine Gesellschaft von elf gegliederten Würmern aufzufassen, denen die kleine centrale Scheibe nur als gemeinsamer Vereinigungspunkt und Ernährungs-Centrum

Digitized by Google

dient. Diese Theorie, welche die historische Entstehung des Sternthierstammes vortrefflich erklärt und die Seesterne als Würmerstöcke deutet, aus denen sich die anderen Sternthierformen erst später durch Centralisation des Stockes entwickelt haben, wird gerade durch die schöne Brisinga vortrefflich gestützt. Ein besonderes Interesse erhält aber die Brisinga noch dadurch, daß sie ein vollkommenes Mittelglied, eine verbindende Uebergangsstufe zwischen den beiden scharf getrennten Gruppen der heute noch lebenden Seesterne darstellt, zwischen den gegliederten Seesternen oder Colastren und den schlangenarmigen Seesternen oder Ophiuren. Indem die Brisinga in ihrem Körperbau die charakteristischen Merkmale beider Gruppen vereinigt, zeigt sie sich als einen wenig veränderten, directen Nachkommen jener uralten und längst ausgestorbenen Seestern-Form, welche den Uebergang von älteren Gliedersternen (Colastra) zu den jüngeren Schlangensternen (Ophiurae) bildete und die Stammform der letzteren wurde.

Ein ähnliches historisches Interesse knüpft sich an das zweite vorher genannte Sternthier, welches in den tiefen Abgründen der nordischen Meere lebt und welches von dem Sohne von Sars erst vor vier Jahren bei den Lofoten-Inseln in einer Tiefe von 1800 Fuß entdeckt wurde. Das ist der Rhizocrinus lofotensis, ein zierliches Astrod aus der Klasse der Seelilien. Die Seelilien oder Crinoiden gleichen einem fünfstrahligen Seestern mit gefiederten Armen. Sie kriechen aber nicht, gleich den Seesternen, frei auf dem Meeresboden umher, sondern sind auf einem schlanken gegliederten Stiele festgewachsen, wie eine einblüthige Lilie. In einer früheren Periode der Erdgeschichte, vor vielen Millionen Jahren, bedeckten diese Seelilien den Meeresboden in einer großen Menge und Mannichfaltigkeit von schönen Formen. Sie bildeten im Verein mit den blumengleichen Korallen bunte Wiesen, auf denen die dichterische Phantasie die lilienarmige

Digitized by Google

Meeresgöttin Thetis und ihre anmuthigen Gefährtinnen ihre Tänze aufführen lassen konnte. Gegenwärtig jedoch, und schon seit langer Zeit, ist die formenreiche Klasse der Seelilien beinahe ausgestorben und nur wenige Arten, welche fast alle einer einzigen Gattung angehören, haben bis heute den Kampf um's Dasein glücklich bestanden. Der norwegische Rhizokrinus aber, welcher neuerdings auch an anderen Stellen des nordatlantischen Oceans, in der Nähe der schottischen und der nordamerikanischen Küsten, in großen Tiefen gefunden worden ist, gehört zu einer Familie von Seelilien, welche man seit vielen Jahrtausenden ausgestorben glaubte. Die Ueberraschung über die Thatsache, daß ein vereinzelter Nachkomme jener fossilen Crinoiden noch heute in der Abgeschiedenheit der schwarzen Meerestiefen sein einsames Dasein fristet, war daher nicht gering.

Außer dem Rhizokrinus und der Brisinga hat man in der neuesten Zeit in Tiefen von 2000 Fuß und darüber noch eine Anzahl von anderen merkwürdigen Thieren verschiedener Klassen entdeckt, welche alle durch ihren gesammten Körperbau ein sehr hohes Alter bekunden und weniger der Gegenwart, als der vor Millionen von Jahren entschwundenen Primär-Periode der Erdgeschichte, der Steinkohlenzeit und der permischen Periode, anzugehören scheinen. Sie sind näher den damals lebenden, als den heutigen Vertretern derselben Thierklassen verwandt, gleichsam „lebende Fossile". Offenbar konnten diese trägen Geschöpfe an der Oberfläche des Meeres und im Lichte der Sonne, wo der lebhafte Kampf um's Dasein beständig die mannichfaltige Bevölkerung zur Arbeitstheilung und zu fortschreitender Entwickelung anspornte, die lebhafte Concurrenz mit ihren immer mehr sich vervollkommnenden Verwandten und Nachkommen nicht mehr bestehen. Die natürliche Züchtung trieb die conservativen Herren tiefer und tiefer in das unergründliche Dunkel der stillen Ab-

Digitized by Google

gründe hinab. Hier können sie noch jetzt, getrennt vom hellen Lichte und bunten Leben der Oberfläche, in stiller Abgeschiedenheit ihr beschauliches Leben weiter führen und von der guten alten Zeit der Steinkohlen-Wälder und des rothen Sandsteins träumen. Möchten doch auch die conservativen Klassen der menschlichen Gesellschaft diesem löblichen Beispiele folgen und sich, wenn auch nicht in die Tiefen des Meeres, doch in die einsamen Wüsten oder Gebirgs-Einöden zurückziehen. Sie würden dann wenigstens der fortschreitenden Entwickelung des nach Vervollkommnung strebenden Theiles der Menschheit keine Hindernisse mehr in den Weg legen können!

Während man von der Existenz einzelner der angeführten Thierformen in Tiefen von 1000—2000 Fuß schon seit langer Zeit wußte, so sind dagegen die ersten sicheren Beobachtungen über thierisches Leben in viel größeren Tiefen erst vor wenigen Jahren bekannt geworden. Im Jahre 1861 wurde aus dem Mittelmeere das abgerissene Ende eines Telegraphen-Kabels gehoben, welches die Verbindung zwischen Cagliari auf der Insel Sardinien und Bona in Afrika vermittelt und zwei Jahre lang in einer Tiefe von 6000—8500 Fuß gelegen hatte. Dasselbe war mit einem Dutzend verschiedener Arten von lebenden Muscheln, Schnecken, Würmern, Sternthieren und Korallen bedeckt. Mehrere von diesen, namentlich Korallen, kannte man bis dahin nur in versteinertem Zustande aus tertiären Gebirgsschichten der Mittelmeerküste, ebenfalls „lebende Fossile".

In demselben Jahre (1861) wurden in dem nördlichen Eismeere, in der Nähe von Spitzbergen, zahlreiche Tiefgrund-Untersuchungen von einer schwedischen Expedition von Naturforschern angestellt, welche unter Thorell's Leitung stand. Die Dredsche-Versuche erstreckten sich bis zu derselben Tiefe, in welcher das Telegraphen-Tau zwischen Cagliari und Bona gelegen hatte.

Digitized by Google

Auch hier fanden sich noch in einer Tiefe von 6000—8400 Fuß zahlreiche lebende Organismen, größtentheils allerdings mikroskopisch kleine Urwesen aus der Klasse der Polythalamien, dazwischen aber auch größere Thierformen verschiedener Klassen, insbesondere mehrere Arten von Würmern und Krebsthieren, ferner Mollusken, Sternthiere und Schwämme. Noch reicher war die Ausbeute der vierten schwedischen Expedition nach Spitzbergen, welche 1868 unter der Leitung von Nordenskiöld ausgeführt wurde. Hier wurden zahlreiche wirbellose Thiere noch in Tiefen von 4000—6000 Fuß, einzelne aber sogar noch in Tiefen bis über 12,000 Fuß angetroffen. In den Tiefen zwischen 6000 und 12,000 Fuß und darüber war der ganze Meeresboden mit dem merkwürdigen Bathybius-Schlamm bedeckt, den wir sogleich noch näher ins Auge fassen werden.

Aehnliche Resultate erhielten in den letzten drei Jahren die von der nordamerikanischen und englischen Regierung ausgerüsteten Expeditionen. Die amerikanischen Untersuchungen, an denen der Zoologe Pourtales Theil nahm, geschahen hauptsächlich an der Küste der Halbinsel Florida. Die englischen Expeditionen, bei denen drei Zoologen, Carpenter, Wyville Thomson und Gwyn Jeffreys thätig waren, bewegten sich theils in der Gegend der Far-Oer-Inseln und des nördlichen Schottlands, theils in der Bucht von Biscaya. Hierbei muß nochmals rühmend die außerordentliche Liberalität hervorgehoben werden, mit welcher die englische, die schwedisch-norwegische und die nordamerikanische Regierung diese Expeditionen ausrüsteten und den dabei betheiligten Naturforschern alle erwünschten Mittel zur Verfügung stellten; Alles für einen rein wissenschaftlichen Zweck. Von unsern deutschen Regierungen ist leider ein Gleiches noch nicht zu sagen. Nur die österreichische Regierung, welche schon mehrfach ihre Kriegsschiffe für naturwissenschaftliche Expeditionen

Digitized by Google

verwerthete, hat in neueſter Zeit eine Expedition für Tiefſee-Unterſuchungen im Mittelmeere ausgerüſtet. In unſerem Norddeutſchen Bundesſtaate iſt von einer derartigen Verwendung der Marine für naturwiſſenſchaftliche Werke noch keine Rede, obwohl die Kriegsſchiffe in Friedenszeiten keine paſſendere und nützlichere Verwerthung finden könnten. Rückſichtslos verzehrt bei uns der ungeheure Militär-Aufwand für ſich allein die reichen Mittel, welche in anderen Ländern zur Förderung von Wiſſenſchaft und Kunſt, von Unterricht und Bildung verwendet werden. Sei aber wenigſtens hierbei noch die Bemerkung geſtattet, daß trotzdem, trotz aller mangelnden Unterſtützung von Seiten der größten norddeutſchen Regierung, die deutſchen Naturforſcher ſich faſt in allen Zweigen an der Spitze des Fortſchritts erhalten und namentlich auch um unſere Kenntniß des Meereslebens hoch verdient gemacht haben. Alljährlich geht ſeit langer Zeit eine Zahl von deutſchen Zoologen, mit Mikroſkopen und Netzen ausgerüſtet, an die Meeresküſte und iſt um die Erforſchung der niederen Seethiere, die nach ſo vielen Richtungen der Biologie Licht verbreiten, unermüdlich bemüht. Und obgleich uns die glänzende Ausſtattung und die reichen Hilfsmittel unſerer engliſchen und ſcandinaviſchen Mitarbeiter abgehen, obgleich wir alle dieſe marinen Expeditionen aus unſeren dürftigen privaten Mitteln beſtreiten, nur bisweilen von einer kleineren deutſchen Regierung unterſtützt, die ihren Ruhm in der Förderung wiſſenſchaftlicher Beſtrebungen ſucht, dürfen wir dennoch beanſpruchen, für die intenſive Erforſchung des marinen Thierlebens viele der beſten, ja im Verhältniß die fruchtbarſten Beiträge geliefert zu haben. Es genügt dafür, den Namen Johannes Müller's und ſeine zahlreichen Schüler anzuführen.

Die vorher angeführten Thatſachen, daß ein verhältnißmäßig reiches und mannichfaltiges Thierleben noch in 2000 und ſelbſt

Digitized by Google

3000 Fuß Tiefe existirt, daß zahlreiche wirbellose Thiere bis zu 6000 und 8000 Fuß und einige wenige sogar noch bedeutend tiefer hinabsteigen, sind übrigens keineswegs das wichtigste Resultat, welches die vervollkommneten Tiefgrund-Untersuchungen der letzten Jahre geliefert haben. Ungleich wichtiger und interessanter sind vielmehr die überraschenden Entdeckungen, zu welchen die Erforschung des Meeresbodens in größeren Tiefen, zwischen 10,000 und 30,000 Fuß, geführt hat.

Wenn auch einzelne niedere Thiere, namentlich Schwämme, Korallen und Würmer, hie und da bis zu 10,000 oder sogar 12,000 Fuß hinabsteigen, so scheint dies doch nur eine seltene Ausnahme zu sein. In den Meerestiefen unterhalb 10,000 Fuß und namentlich in den ungeheuren Abgründen zwischen 20,000 und 30,000 Fuß scheint gewöhnlich *für das unbewaffnete Auge* alles Leben gänzlich erloschen zu sein. Ein ganz anderes Resultat aber offenbart uns hier das Mikroskop. Gerade in diesen scheinbar lebloſen Abgründen ist der Meeresboden mit einer dichten Decke von sehr zahlreichen, dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen überzogen, und zwar in einer solchen Fülle, daß der Boden selbst gewissermaßen lebendig ist. Gerade diese höchst merkwürdige Thatsache und die daran sich knüpfenden wichtigen Folgerungen verleihen jenen Tiefgrund-Forschungen ihre außerordentliche Bedeutung.

Der Boden jener größeren Meerestiefen, und zwar allgemein, wie es scheint, zwischen 5000 und 25,000 Fuß, oft aber schon zwischen 3000 und 5000 Fuß, ist mit einem Schlamm oder Mulder (Mud, Ooze) von höchst merkwürdiger Beschaffenheit bedeckt. Dieser Schlamm, den wir wegen des wichtigsten darin vorkommenden Organismus kurz *Bathybius-Schlamm* nennen wollen, findet sich in ganz gleicher Beschaffenheit an allen Stellen der Erde, an denen man bis jetzt so bedeutende Tiefen

Digitized by Google

sondirt hat. Er bedeckt namentlich in einer zusammenhängenden Schicht das sogenannte „Telegraphen-Plateau". Das ist eine ungeheure Tiefsee-Ebene, welche sich mit einer durchschnittlichen Tiefe von 12,000 Fuß von Irland durch die ganze Breite des nord-atlantischen Oceans hindurch bis nach Nord-Amerika erstreckt, und im Süden gegen die Azoren hin in noch bedeutend größere Tiefen sich hinabsenkt. Dieses ganze ausgedehnte Telegraphen-Plateau scheint mit Bathybius-Schlamm überzogen zu sein.

Bathybius ist ein griechisches Wort und bedeutet: „in der Tiefe lebend". Der Bathybius-Schlamm ist in der That lebendiger Schlamm der Meerestiefen. Zuerst wurde dieser Schlamm im Jahre 1857 von Capitän Dayman, dem Kommandanten des englischen Kriegsschiffes Cyclops, empor gebracht, und von dem ersten englischen Zoologen, Professor Hurley, genau untersucht. Die von ihm gewonnenen Resultate wurden 1860 von Dr. Wallich bestätigt, welcher die atlantische Sondirungs-Expedition des Kriegsschiffes Bulldog unter dem Kommando von Mc. Clintock begleitete. Auch die Mikroskopiker, welche späterhin den Bathybius-Schlamm untersuchten, namentlich im letzten Sommer Professor Carpenter und Wyville-Thomson, haben Hurley's Angaben im Wesentlichen bestätigt. Ich selbst erhielt im vorigen Herbst eine Probe von Bathybius-Schlamm durch die Güte meines verehrten Collegen, Herrn Professor Preyer. Es war eine Probe des atlantischen Schlammes, welche am 22. Juli 1869 von Carpenter und Thomson aus 2435 Faden (14,610 Fuß) Tiefe an Bord des „Porcupine" gehoben worden war (in 47° 38" nördlicher Breite, 12° 4" östlicher Länge). Der Schlamm war sorgfältig in einem Glase mit Weingeist aufbewahrt und bestätigte mir bei der genauesten mikroskopischen und chemischen Untersuchung

Digitized by Google

alle die merkwürdigen Resultate, welche Professor Huxley in seiner letzten ausführlichen Mittheilung über den Bathybius (1868) veröffentlicht hatte. [2])

Der Bathybius-Schlamm erscheint in feuchtem Zustande für das bloße Auge als ein äußerst feinkörniger, zähflüssiger Brei von blaß graubrauner oder gelblich grauer Farbe, in welchem gröbere Formbestandtheile gar nicht sichtbar sind. Seine auffallendste Eigenschaft ist ein sehr hoher Grad von Klebrigkeit. Schon der erste Beobachter, Capitän Dayman, bemerkt in dieser Beziehung: „Die weiche, mehlige Substanz, welche den Boden des ganzen Telegraphen-Plateaus bedeckt, ist merkwürdig zähe und klebrig, so daß sie an dem Tau und Loth des Senkapparates fest hängen bleibt, auch wenn letzterer beim Heraufziehen durch eine Wassersäule von mehr als 12,000 Fuß hindurch passiren muß." Auch an meiner in Weingeist conservirten Probe war diese auffallende Klebrigkeit, die man mit derjenigen von recht dickflüssigem Honig vergleichen kann, vollständig erhalten. Wenn man den Schlamm trocknet, erscheint er als ein grauweißes, schwer zerreibliches, feines kreideartiges Pulver, das man leicht mit dem gewöhnlichen Kalkstaube unserer Chausseen verwechseln könnte. Bringt man aber nur ein Nadelspitzchen von dem Schlamm unter das Mikroskop, so wird man durch den Anblick einer ungeheuren Menge von größeren und kleineren, zierlich geformten Körperchen überrascht. Die Mehrzahl unter den größeren Körperchen sind sogenannte Globigerinen, kalkschalige Wurzelfüßer oder Rhizopoden aus der Polythalamien-Gruppe [3]). (Vergl. im Titelbilde Fig. g 1—g 6 und h 1—h 3). Ihr weicher Körper besteht aus weiter Nichts, als aus einem kleinen Klümpchen von jenem hochwichtigen Urschleim oder Protoplasma, den wir sogleich noch näher ins Auge fassen müssen. Das kleine Schleimklümpchen ist von einer mehrkammrigen

Digitized by Google



Fig. 2. Eine lebende Globigerine mit einer aus vierzehn Kammern zuſammengeſetzten Kalkſchale und mit ausgeſtreckten Pſeudopodien (verzweigten und verſchmelzenden Fäden von Urſchleim oder Protoplasma).

Kalkſchale umſchloſſen. Die Schalenkammern, ſpiralig um eine Axe aufgerollt, ſind faſt kugelig. Ihre Wand iſt von ſehr feinen Löchern ſiebartig durchbrochen, aus denen äußerſt zarte Fäden hervorgeſteckt werden. Dieſe Fäden, unmittelbare Verlängerungen der ſchleimigen Körperſubſtanz, ſind die einzigen Organe des kleinen Weſens, mit welchen daſſelbe kriecht, frißt und empfindet. [3]) Neben den Globigerinen finden ſich in dem Bathybius-Schlamm auch noch andere verwandte Rhizopoden, obwohl ſeltener. Im Titelbilde iſt eine ſolche, Textilaria benannte Polythalamie bei i abgebildet. Zwiſchen den Polythalamien zerſtreut liegen zahlreiche Radiolarien, die

Digitized by Google

sich durch sehr mannichfaltig geformte und zierliche Kieselschalen auszeichnen.[4]) Zwei solche Radiolarien oder Strahl-Rhizopoden sind auf dem Titelkupfer abgebildet, links oben (bei e) eine gegliederte helmförmige Gitterschale mit aufgesetzter Stachelspitze (Eucyrtidium), rechts in der Mitte (bei f) eine kugelige Kieselschale mit 6 radialen Stacheln (Haliomma). Auch ziemlich viele Diatomeen, oder Kieselzellen, finden sich im Bathybius-Schlamme vor. Die meisten gehören zu der Gattung Coscinodiscus und bilden eine kreisrunde Kieselscheibe mit regelmäßig parquetirter Oberfläche (Fig. d im Titelbilde). Von den Diatomeen, sowie von den zierlichen Radiolarien, ist es sehr wahrscheinlich, daß sie größtentheils (wenn nicht ausschließlich) Bewohner der Meeresoberfläche sind, deren unzerstörbare Kieselskelete erst nach ihrem Tode auf den Meeresboden herabsinken. Von den Globigerinen dagegen und von dem Bathybius ist diese Annahme nicht zulässig. Diese beiden Organismen sind die eigentlichen Bewohner der Abgründe. Der Zahl nach bilden übrigens die Hauptmasse der Schlamm-Bestandtheile nicht die angeführten Rhizopoden, sondern viel kleinere runde Scheiben von Kalkerde, die Coccolithen, und sodann eine erstaunlich große Menge unregelmäßiger Klumpen von freiem Urschleim oder Protoplasma. Das ist Hurley's Bathybius Haeckelii.

Bevor wir nun die Bathybius-Klumpen und die dazu gehörigen Coccolithen näher betrachten, müssen wir nothwendig noch ein paar Worte über die Sachen bemerken, die sich nicht im Bathybius-Schlamme vorfinden. Man sollte erwarten, in diesem, wie in dem gewöhnlichen Grunde des flacheren Meeres, eine Menge von ganzen und zertrümmerten Skelettheilen der gemeinen und überall verbreiteten Seethiere zu finden. Die unverweslichen und schwer zerstörbaren Kalkschalen der Muscheln und Schnecken, Kalkpanzer von Seesternen und Seeigeln, Kalkröhren von

Digitized by Google

Würmern und Kalkstöcke von Korallen, ferner Knochen und Zähne von Fischen, findet man allenthalben an den flacheren Meeresstellen auf dem Boden zerstreut vor. Von allen diesen harten Formbestandtheilen höherer Thiere findet sich in dem Bathybius-Schlamme entweder keine Spur, oder nur hie und da zufällig ein einzelnes verlorenes Stückchen. Selbst die Kieselnadeln von Schwämmen, die sonst überall im Meere zerstreut vorkommen, sind nur selten und einzeln zu finden. Gänzlich fehlt ferner jede Spur von einem pflanzlichen Organismus. Auffallend ist endlich die verhältnißmäßig sehr geringe Menge von kleinen Gesteins-Trümmern, Krystallen und anderen anorganischen Körperchen.

Was sind und was bedeuten nun aber jene vorher angeführten, mikroskopisch kleinen Organismen, welche die Hauptmasse des lebendigen Bathybius-Schlammes bilden? Wenn es keine Pflanzen sind, müssen es doch wohl Thiere sein! Die vorsichtigste Antwort hierauf lautet: Nein! Alle jene kleinen Lebewesen, welche zu unzähligen Milliarden zusammengedrängt den tiefsten Meeresboden bevölkern, und welche gewissermaßen eine lebendige Bodendecke in den tiefsten, bisher für leblos gehaltenen Abgründen des Oceans bilden, alle jene Globigerinen und Radiolarien, Coccolithen und Protoplasma-Körper, gehören zu einer Gruppe von niedersten und unvollkommensten Wesen, welche weder echte Thiere noch echte Pflanzen sind, und welche man daher am besten vorläufig in dem neutralen Zwischenreiche der Urwesen oder Protisten vereinigt.

Die Unterscheidung von Thier und Pflanze ist kinderleicht bei allen höher entwickelten Formen der beiden großen organischen Reiche. Je tiefer wir aber in beiden Reichen auf der großen Stufenleiter der Entwickelung hinabsteigen, desto mehr verwischen und vermengen sich die bezeichnenden Charaktere, die wesentlichen

Digitized by Google

Eigenschaften, durch welche Jedermann mit Leichtigkeit Thier und Pflanze glaubt unterscheiden zu können. Zuletzt stoßen wir tief unten auf eine große Anzahl von vielgestaltigen, meist dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen, über deren Thier- oder Pflanzen-Natur von den Naturforschern ein unendlicher und unlöslicher Streit geführt wird. Diese neutralen Urwesen sind eben in der That weder Thiere, noch Pflanzen; sie sind Protisten.

Es ist hier nicht der Ort, die schwierige Frage von den Grenzen des Thier- und Pflanzenreichs, und von der neutralen Stellung des Protisten-Reiches mitten zwischen Beiden, zu erörtern.[5]) Doch müssen wir nothwendig zum Verständniß des Folgenden ein paar Worte über die fundamentale Uebereinstimmung im Körperbau der drei organischen Reiche hier einschalten. Bekanntlich gilt als das gemeinsame Form-Element, als der einfache Baustein, aus dem der Körper aller Thiere und Pflanzen aufgebaut ist, die sogenannte Zelle. Seit 50 Jahren wissen wir, daß jeder höhere Organismus aus sehr zahlreichen, aus Tausenden oder Millionen von Zellen zusammengesetzt ist. Diese entstehen durch wiederholte Theilung aus der einfachen einzelnen Zelle, welche jedes Thier und jede Pflanze im Beginne ihrer individuellen Existenz bildet. Das Thier-Ei sowohl als das eigentliche Pflanzen-Ei ist weiter Nichts als eine einfache Zelle. Es giebt aber auch eine Anzahl von niederen Organismen, welche zeitlebens auf dieser Stufe der einfachen Zelle stehen bleiben.

Obwohl die verschiedenen Zellen nicht allein bei den verschiedenen Arten von Organismen, sondern auch an den verschiedenen Körpertheilen eines und desselben Organismus an Form, Größe und Zusammensetzung höchst mannichfaltig geartet sind, so sind dennoch diese zahllosen Unterschiede erst durch Anpassung erworben. Ursprünglich sind alle Zellen gleich gebildet und bestehen im Wesentlichen aus einem weichen Schleimklümpchen,

Digitized by Google

das einen festeren rundlichen Kern einschließt; im Groben ungefähr vergleichbar einer geschälten Kirsche oder Pflaume. Sehr häufig, aber nicht immer, wird späterhin dieses nackte weiche Klümpchen oder Klößchen von einer äußeren festen Hülle, einer „Zellenmembran", umschlossen. Dann besteht die Zelle (vergleichbar einer ganzen, ungeschälten Kirsche oder Pflaume) aus drei verschiedenen Bestandtheilen: aus festflüssigem Zellstoff, äußerer Hülle und innerem Kern. Sowohl der Kern oder Nucleus, als auch der Zellstoff oder das Protoplasma gehören in stofflicher Beziehung zu jener Gruppe von Körpern, welche die Chemiker Eiweißkörper (Albuminate) oder Proteïnkörper nennen. Das sind die wichtigsten von allen Substanzen, welche wir kennen. Denn sie sind die Träger, wenn nicht die Factoren, der sogenannten „Lebenserscheinungen", und überall, wo wir an einem Naturkörper Ernährung und Fortpflanzung, Bewegung und Empfindung wahrnehmen, erscheint als die active Grundlage dieser Lebenserscheinungen ein eiweißartiger oder schleimartiger Körper, und zwar immer von jener Art der Zusammensetzung, welche dem Protoplasma eigenthümlich ist.

Die ältere Naturphilosophie im Anfange unseres Jahrhunderts, an ihrer Spitze der geniale Oken, hatte die Behauptung aufgestellt, daß alles Lebendige aus einer weichen, eiweißartigen Masse, dem sogenannten Urschleim, hervorgegangen sei. Die Eigenschaften, welche jene Naturphilosophen ihrem berüchtigten Urschleime zuschrieben, sind im Wesentlichen dieselben, welche die spätere Erfahrung uns an dem Protoplasma kennen gelehrt hat. Die verrufene „Urschleimtheorie" Oken's hat durch die berühmte „Protoplasmatheorie" Max Schultze's, die gegenwärtig das feste Fundament für unsere ganze biologische Erkenntniß bildet, gewissermaßen ihre eingehende Begründung erfahren. Thatsache ist, daß bei allen Organismen ohne Aus-

Digitized by Google

nahme die Lebenserscheinungen an einen bestimmten Stoff geknüpft sind. Dieser Lebensstoff ist zwar im Einzelnen unendlich mannichfaltig, aber im Wesentlichen doch immer gleichartig zusammengesetzt, und stellt eine Verbindung von vier Elementen dar, von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Oft kommt dazu als fünftes Element noch Schwefel. Im Grunde ist es sehr gleichgültig, ob wir diese Verbindung mit der älteren Naturphilosophie als Urschleim oder Lebensstoff, oder mit der neueren Biologie als Sarcode oder Protoplasma bezeichnen. Der Ausdruck Urschleim ist insofern nicht glücklich gewählt, als man bei Schleim gewöhnlich an eine sehr wasserreiche und zerfließliche Substanz denkt. Allerdings ist das lebende Protoplasma immer weich oder festflüssig, indem stets eine mehr oder minder ansehnliche Wassermenge die stickstoffhaltige Kohlenstoff-Verbindung durchtränkt und aufgequollen erhält. Allein während in manchen Fällen das Protoplasma so dünnflüssig wie gewöhnlicher Schleim ist, erscheint es dagegen in anderen Fällen so dicht und fest, wie ein Stück Kautschuk oder Leder. Bezeichnender wäre daher eigentlich der Ausdruck Bildungsstoff.

Auch bei allen Protisten, wie bei allen Thieren und Pflanzen, ist der einzige wesentliche und niemals fehlende Körperbestandtheil dieser Bildungsstoff, der Urschleim oder das Protoplasma. Alle übrigen Stoffe, die sonst noch im Organismus vorkommen, sind erst vom Urschleim producirt oder abgeleitet. Wir stoßen aber bei vielen Protisten auf die sehr wichtige Thatsache, daß sie noch nicht einmal den Formwerth einer einfachen Zelle haben, indem ihnen jede Spur von Kern fehlt. Der ganze lebendige Leib besteht hier bloß aus structurlosem Urschleim ohne Kerne, und kann daher auch nicht als echte Zelle, sondern nur als Cytode, d. h. als zellenähnlicher Elementar-Organismus bezeichnet werden. Die Zellen und die Cytoden sind

Digitized by Google

demnach zwei verſchiedene Arten oder richtiger Stufen von elementaren Organismen, oder von lebendigen Individuen erſter Ordnung. Wir können dieſe beiden Stufen von Lebenseinheiten unter dem Namen der Bildnerinnen oder Plaſtiden zuſammenfaſſen. Denn ſie allein bilden und bauen in der That alle belebten Naturkörper auf. Die kernloſen Cytoden ſind die niedere und urſprüngliche Stufe, die kernhaltigen Zellen dagegen die höhere und entwickeltere Stufe der Plaſtiden.[6])

Cytoden oder kernloſe Plaſtiden ſind nun auch die vorher genannten Globigerinen, welche die Mehrzahl von den größeren geformten Körperchen des Tiefſeegrundes bilden. Ihr Körperchen beſteht bloß aus der mehrkammerigen Kalkſchale und dem darin eingeſchloſſenen Urſchleim. Aehnliche Cytoden ſind auch die übrigen Polythalamien, deren mikroſkopiſch kleine Kalkſchalen ſich oft in ſolchen Maſſen auf dem Meeresboden anhäufen, daß ſie allein bei ſpäter eintretender Hebung des Bodens ganze Gebirge zuſammenſetzen, ſo z. B. des Nummulitengebirge an den Küſten des Mittelmeeres, die Steine, aus denen die egyptiſchen Pyramiden aufgebaut ſind.

Es giebt aber noch einfachere und unvollkommnere Protiſten, als dieſe Polythalamien. Das ſind die merkwürdigen Moneren, die denkbar einfachſten unter allen lebendigen Weſen.[7]) Das griechiſche Wort Moneres bedeutet „Einfach“. Ihr ganzer Körper beſteht zeitlebens einzig und allein aus einem nackten, ſtructurloſen Klümpchen von beweglichem Urſchleim, ſelbſt ohne die ſchützende Kalkhülle der Polythalamien. Man kennt dieſe wunderbaren Urweſen erſt ſeit ſechs Jahren. Sie ſcheinen aber in den ſüßen Gewäſſern ſowohl als im Meere keineswegs ſelten zu ſein, und ſind wahrſcheinlich ſogar ſehr weit verbreitet. Eigentlich verdienen dieſe einfachſten Lebeweſen kaum noch die

Digitized by Google

Bezeichnung von Organismen. Denn sie besitzen keine Spur von Organen, keine Spur von verschiedenartigen Körpertheilen. Und dennoch wachsen die Moneren und ernähren sich, dennoch sind sie reizbar und empfindlich; dennoch bewegen sie sich und pflanzen sie sich fort. Der structurlose Urschleim ist hier Alles in Allem. Der Theil ist gleich dem Ganzen. Denn wenn man ein Moner in mehrere Stückchen zerschneidet, so lebt jedes Stückchen gleich eben so gut weiter, wie das ganze Urschleim-Klößchen. Eine bestimmte Form besitzen sie auch nicht, sondern ändern dieselbe fortwährend, indem sie sich bewegen. Im Ruhezustand sind sie meist kugelig abgerundet. Die Fortpflanzung erfolgt in der einfachsten Weise, indem das Protoplasma-Körperchen entweder in zwei Hälften oder in eine größere Anzahl von Stückchen zerfällt, jedes von denselben Eigenschaften, wie das mütterliche Urwesen. Die Moneren liefern uns so den unwiderleglichen Beweis dafür, daß die Lebenserscheinungen nicht an einen maschinenartig zusammengesetzten Körper gebunden sein müssen, sondern an eine bestimmte chemische Konstitution der Materie, an das formlose Protoplasma. Die Organisation oder die scheinbar zweckmäßige Zusammensetzung des Körpers aus verschiedenartigen Theilen ist nicht die Ursache, sondern die Wirkung des Lebens, das secundäre Product der Wechselwirkung von Vererbung und Anpassung![7])

Zu diesen wunderbaren Moneren gehört nun auch der merkwürdige Bathybius, das wichtigste von allen Protisten, welche die Abgründe des Meeres beleben. Wie schon erwähnt, hat Huxley mit diesem Namen die freien, nackten Protoplasma-Klumpen bezeichnet, die in erstaunlicher Menge in dem Tiefseegrunde vorkommen, und denselben neben den Globigerinen wesentlich zusammensetzen. Es sind unregelmäßig gestaltete Ur-

Digitized by Google

schleim-Körper von sehr verschiedener Größe, die größten mit bloßem Auge als Pünktchen sichtbar. (Auf dem Titelkupfer sind diese Bathybius-Cytoden mit a und b bezeichnet. In Fig. a 1 bis a 4 und b 1—b 3 sind unregelmäßige (amoebenförmige) Urschleimstücke abgebildet, in Fig. a 9 und b 4 netzförmige Stücke. Die mit b bezeichneten Cytoden enthalten Coccolithen, die mit a bezeichneten dagegen nicht.) Ihr chemisches Verhalten beweist ihre Protoplasma-Natur unzweifelhaft. Auch haben Carpenter und Thomson im letzten Sommer an dem eben heraufgeförderten Bathybius-Schlamme die charakteristischen Bewegungserscheinungen des Urschleims wahrgenommen. In dem von mir untersuchten Tiefseegrunde sind die Bathybius-Klößchen in solcher Menge zusammengehäuft, daß sie etwa ¼—½ der ganzen Masse bilden, eine Thatsache von außerordentlicher Bedeutung. Diese Protoplasma-Haufen scheinen auch die einzige Ursache der merkwürdigen Klebrigkeit zu sein, durch welche sich der Tiefseegrund von gewöhnlichem Schlamm so auffallend unterscheidet.

Vor den übrigen Moneren zeichnet sich Bathybius dadurch aus, daß er bei seinem Stoffwechsel kleine Körperchen von kohlensaurem Kalk ausscheidet. Das sind die schon erwähnten Kernsteine oder Coccolithen, die zahlreichsten unter allen kleineren Formbestandtheilen des Tiefseegrundes. (Im Titelbilde Fig. c 1 bis c 4.) Ihr Entdecker, Huxley, nannte sie zuerst (1858) Coccolithen, unterschied aber zehn Jahre später (1868) als zwei verschiedene Formen derselben die Diskolithen und Cyatholithen. Die Diskolithen oder Scheibensteine sind einfache, kreisrunde oder elliptische Scheiben von kohlensaurem Kalk, concentrisch geschichtet wie Stärkemehl-Körnchen (Fig. Aa, Ab, S. 36). Die Cyatholithen oder Napfsteine sind aus zwei eng verbundenen Scheiben zusammengesetzt, von denen meistens die kleinere eben, die größere conver vorgewölbt ist. Daher besitzen sie genau die Form

Digitized by Google



Fig. A. Ein Diskolith oder Scheibenstein, a von der Fläche, b vom Rande.
Fig. B. Ein Cyatholith oder Napfstein, a von der Fläche, b vom Rande.
Fig. C. Eine Kernkugel oder Coccosphäre.

von gewöhnlichen Hemdenknöpfchen oder Manschettenknöpfchen (Fig. Ba, Bb). Zwischen den ungeheuren Massen derselben kommen einzeln auch Kugeln vor, welche aus mehreren solchen Scheiben zusammengesetzt erscheinen: Kernkugeln oder Coccosphären (Fig. C). Alle diese geformten Kalkkörperchen scheinen lediglich Ausscheidungsproducte des Bathybius zu sein, und sich zu dessen nackten Urschleimstücken ebenso zu verhalten, wie die Kalknadeln oder Kieselnadeln eines Schwammes zu dessen lebendigen Zellen. Die geformten Kalkkörperchen des Bathybius sind deßhalb noch von besonderer Wichtigkeit, weil sie auch massenhaft versteinert vorkommen, und zwar in der weißen Kreide. Dadurch wird wiederum die längst aufgestellte Ansicht bestätigt, daß die Kreidelager Tiefseebildungen sind, verhärteter Schlamm, welcher in sehr bedeutenden Tiefen des offenen Oceans abgelagert wurde. Die Uebereinstimmung zwischen dem lebenden Bathybius-Schlamme und der fossilen Kreide wird dadurch vollständig, daß auch die Kalkschalen der Globigerinen neben den Coccolithen und Coccosphären zu den Hauptbestandtheilen der Kreide gehören. Mit anderen Worten: der Bathybius-Schlamm, welcher noch heutzutage den Boden unserer größten Meerestiefen bedeckt, ist in Bil-

Digitized by Google

dung begriffene Kreide. Die Organismen aber, welche diese moderne Kreide bilden, sind weder Thiere noch Pflanzen, sondern lediglich Protisten.

Wenn man diese merkwürdigen Verhältnisse der lebendigen Tiefsee-Bevölkerung in eingehendere Erwägung zieht, so drängen sich eine Menge von bedeutsamen Fragen auf. Sei es mir schließlich gestattet, in Kürze noch auf zwei von diesen Fragen hinzuweisen, auf die Fragen von der Ernährung und von der Entstehungs-Weise derselben.

Die Ernährung des Bathybius und der übrigen Protisten, welche die Abgründe des Oceans zwischen 3000 und 30,000 Fuß beleben, erscheint außerordentlich räthselhaft. Bekanntlich besteht zwischen Thier- und Pflanzen-Reich im Großen und Ganzen in der Ernährungsweise ein durchgreifender Gegensatz, in der Art, daß beide organische Reiche sich gegenseitig ergänzen und in der Oekonomie der Natur das Gleichgewicht halten. Die Pflanzen besitzen meistens die Fähigkeit, aus sogenannten anorganischen Verbindungen, nämlich aus Wasser, Kohlensäure und Ammoniak, durch Sauerstoff-Entbindung und Syntheſe eiweißartige Stoffverbindungen, und vor allem Protoplasma zusammen zu setzen. Diese Fähigkeit besitzen die Thiere nicht. Vielmehr müssen sie das Protoplasma oder den Urschleim, den sie nothwendig für ihr Leben brauchen, direct oder indirect aus dem Pflanzenkörper beziehen. Das Thierleben setzt also eigentlich überall schon das Pflanzenleben voraus.

Wenn wir nun, eingedenk dieses fundamentalen Wechselverhältnisses, die Oekonomie des Meereslebens in Betracht ziehen, so begegnen wir zunächst der befremdenden Thatsache, daß gerade das Pflanzenleben schon in verhältnißmäßig geringer Tiefe gänzlich aufhört. Während die Seethiere massenhaft bis zu 3000 Fuß Tiefe hinabgehen, und einzelne auch noch tiefer, so scheint dagegen

Digitized by Google

das Pflanzenleben in der Regel schon bei 2000 Fuß völlig zu verschwinden. Man nimmt nun an, daß die unterhalb dieser Zone vorkommenden Thiere sich von den unsichtbar kleinen Theilchen von zersetzter organischer Substanz ernähren, die allenthalben im Meereswasser vertheilt sind. In der That ist das Seewasser, besonders in der Nähe der Küsten, keineswegs eine reine Salzlösung, sondern vielmehr eine Art von sehr dünner Brühsuppe. Denn von den zahllosen Thieren und Pflanzen, die täglich im Meere sterben, vertheilt sich immer ein kleinerer oder größerer Bruchtheil der Körpersubstanz, der nicht von anderen Thieren sogleich verzehrt wird, im Wasser. Wenn man nun aber auch seine Phantasie noch so sehr anstrengt, um sich das Meerwasser in der Nähe der Küsten als eine leidlich nahrhafte Bouillon vorzustellen, so gilt das doch keineswegs für den offenen Ocean und besonders für dessen tiefste Abgründe. Gerade hier aber fanden wir jenes wunderbar üppige Protistenleben, jene ungeheuren Protoplasma-Haufen des Bathybius und der Globigerinen. Daß diese alle sich allein von jener homöopathisch verdünnten Brühe, in der vielleicht auf hundert Milliontheile Wasser nur ein Theil organischer Substanz kommt, sollten ernähren können, erscheint bei nüchterner Erwägung aller hier einschlagenden Verhältnisse sehr unwahrscheinlich.

Wenn demnach einerseits die Ernährung des Bathybius-Schlammes durch die im Wasser aufgelöste minimale Quantität von organischer Substanz kaum glaublich erscheint, andrerseits aber die Ernährung jener ansehnlichen Protoplasma-Massen durch Pflanzen bei dem gänzlichen Mangel von Vegetation gänzlich ausgeschlossen wird, so bleibt kaum noch etwas Anderes übrig, als die Annahme, daß die freien Urschleim-Körper des Bathybius sich an Ort und Stelle unter dem Einflusse der eigenthümlichen hier waltenden Existenz-Bedingungen aus anorganischer Substanz bilden;

Digitized by Google

mit anderen Worten, daß sie durch Urzeugung entstehen. Vielleicht leitet uns die Entdeckung des Bathybius auf die lange gesuchte Spur von der spontanen, mechanischen Entstehung des Lebens. Theoretisch hat diese tiefgreifende biologische Grundfrage keine Schwierigkeiten mehr, seitdem die neuere Biologie den durchgreifenden Beweis von der Einheit der organischen und der anorganischen Natur geführt hat, und seitdem insbesondere die Moneren die letzten hier noch bestehenden Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt haben.[8]) Vielleicht ist in dem Bathybius bereits ein Organismus gefunden, der durch Zusammensetzung von Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff in bestimmten verwickelten Verhältnissen freies Protoplasma bildet, der also durch Urzeugung oder Archigonie, auf rein mechanischem Wege, sich selbst erzeugt. Wenigstens ließe sich diese Annahme gerade hier eher, als bei jedem anderen, bisher bekannten Organismus mit triftigen Gründen stützen. Sollte diese Vermuthung richtig sein, so würde sie eine glänzende Bestätigung des mystischen, von Oken prophetisch ausgesprochenen Satzes enthalten: „Alles Organische ist aus Schleim hervorgegangen, ist Nichts als verschieden gestalteter Urschleim. Dieser Urschleim ist im tiefen Meere aus anorganischer Materie entstanden."

Digitized by Google

Erklärung des Titelbildes.

Eine kleine Probe von Bathybiusschlamm bei einer Vergrößerung von 280. (Vergl. S. 25.)

a. Lebendige Urschleimstücke (Protoplasma-Cytoden) des Bathybius, ohne Kalkkörperchen (Coccolithen ꝛc).

a 1, a 2, a 3, a 4. Vier verschiedene Bathybius-Stücke von einfacher unregelmäßiger Form (Protamoeben-Form) mit lappenförmigen Fortsätzen.

a 5, a 6. Zwei kugelige Bathybius-Stücke ohne Hülle (Plasmosphären).

a 7, a 8. Zwei kugelige Bathybius-Stücke mit weicher hautartiger Hülle oder Cyste (Plasmocysten).

a 9. Ein großes netzförmiges Bathybius-Stück, aus vielen dünnen verschmolzenen Protoplasma-Strängen zusammengesetzt (Plasmodium).

b. Lebendige Urschleimstücke (Protoplasma-Cytoden) des Bathybius mit Kalkkörperchen (Coccolithen ꝛc.).

b 1. Ein amoebenförmiges Bathybius-Stück mit einem Coccolithen.

b 2. Ein amoebenförmiges Bathybius-Stück mit zwei Coccolithen.

b 3. Ein großes amoebenförmiges Bathybius-Stück mit zahlreichen Coccolithen und einer Coccosphäre.

b 4. Ein großes netzförmiges Bathybius-Stück, aus vielen dünnen verschmolzenen Protoplasma-Strängen zusammengesetzt, mit zahlreichen Coccolithen.

c. Freie, zwischen den lebendigen Protoplasmastücken des Bathybius in großer Menge zerstreute Kalkkörperchen (Coccolithen und Coccosphären).

c 1. Vier Coccolithen.

c 2. Fünf Coccolithen.

c 3. Drei Coccolithen.

c 4. Zwei Coccolithen.

c 5. Zwei Coccosphären.

d. Eine Diatomee (Coscinodiscus) mit kreisrunder scheibenförmiger wabiger Kieselschale.

e, f. Radiolarien oder radiäre Rhizopoden aus der Protistenklasse der Wurzelfüßer, mit gitterförmig durchbrochener Kieselschale.

e. Eucyrtidium, ein Radiolar aus der Gruppe der Cyrtiden. Die Kieselschale besteht aus sechs hinter einander liegenden ringförmigen Kammern, von denen die erste die kleinste und mit einem Kieselstachel besetzt ist, wie eine Pickelhaube. (Vergl. meine Monographie der Radiolarien, S. 319.)

f. Haliomma, ein Radiolar aus der Familie der Ommatiden. Die Kieselschale besteht aus einer doppelten Gitterkugel (einer inneren und einer äußeren). Die äußere Gitterschale ist mit sechs radialen Stacheln besetzt. Vergl. meine Monographie der Radiolarien, S. 425.)

Digitized by Google

g. Globigerinen, Polythalamien aus der Protistenklasse der Wurzelfüßer, mit poröser vielkammeriger Kalkschale.

g 1. Eine dünnschalige Globigerina mit 6 Kammern.

g 2. Eine dünnschalige Globigerina mit 8 Kammern.

g 3. Eine dünnschalige Globigerina mit 8 Kammern.

g 4. Eine dünnschalige Globigerina mit 10 Kammern.

g 5. Eine dünnschalige Globigerina mit 13 Kammern.

g 6. Eine dickschalige Globigerina mit 10 Kammern.

h. Einzelne abgelöste Kammern von Globigerinen, sogenannte Orbuliner.

h 1. Ein dünnschalige Orbulina.

h 2. Eine dickschalige Orbulina.

h 3. Ein Stück Kammerwand von einer dickschaligen Orbulina.

i. Textilaria, eine kalkschalige Polythalamie mit zweizeilig aufgereihten Kammern.

m. Mineralische Bestandtheile des Bathybius-Schlammes, kleine Bruchstücke von zertrümmerten Gesteinen ꝛc.

Anmerkungen und Citate.

1) Das „biogenetische Grundgesetz", oder das allgemein gültige Entwickelungsgesetz von dem ursächlichen Zusammenhang zwischen der Entwickelung jedes organischen Individuums und der Formenreihe seiner Vorfahrenkette, habe ich ausführlich erörtert und begründet in meiner „Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (Gemeinverständliche wissenschaftliche Vorträge über die Entwickelungslehre im Allgemeinen und diejenige von Darwin, Goethe und Lamarck im Besonderen, über die Anwendung derselben auf den Ursprung des Menschen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Naturwissenschaft). II. Auflage. Berlin 1870. Nach diesem biogenetischen Grundgesetze können wir aus der Formenreihe, die jeder Organismus während seines individuellen Lebens vom Ei bis zum Tode durchläuft, uns eine ungefähre Vorstellung von den verschiedenen Formen machen, welche die Vorfahren desselben im Laufe vieler Jahrtausende angenommen haben. Wie man demgemäß auch von den verschiedenen thierischen Vorfahren des Menschengeschlechts sich ein annähernd richtiges Bild verschaffen kann, haben zwei frühere Vorträge dieser Sammlung gezeigt. (III. Serie, Heft 52 und 53: Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts.) Die Gesetze der Vererbung und der Anpassung, und die zwischen diesen beiden Funktionen beständig stattfindende Wechselwirkung sind die einzige Ursache jenes realen Causalnexus zwischen Ontogenesis und Phylogenesis.

Digitized by Google

2) Die ausführlicheren Resultate meiner mikroskopischen und chemischen Untersuchung des Bathybius-Schlammes, durch zahlreiche Abbildungen erläutert, habe ich in den „Beiträgen zur Plastidentheorie“ mitgetheilt, welche in meinen „Biologischen Studien“ (Leipzig, 1870; mit 6 Kupfertafeln) enthalten sind. Die Leser dieses Vortrages, welche dem Gegenstande ein tieferes Interesse abgewinnen, finden dort namentlich die weitreichenden Folgerungen, welche sich an den Bathybius-Schlamm für die wichtigsten Fragen der Biologie knüpfen, eingehend erörtert.

3) Die außerordentlich formenreiche und interessante Klasse der Wurzelfüßer oder Rhizopoden ist uns erst in den letzten zwanzig Jahren genauer bekannt geworden. Sie lebt größtentheils im Meere, nur einige Arten kommen im süßen Wasser vor. Die Klasse besteht aus drei Ordnungen, den ganz einfach organisirten und meist mit einer Kalkschale versehenen Acyttarien, den höher entwickelten, meist mit Kieselschale gepanzerten Radiolarien, und der kleinen zwischen beiden Ordnungen in der Mitte stehenden Ordnung der nackten Heliozoen (Actinosphaerium Eichhornii, Cystophrys Haeckeliana etc.). Vergl. den 16. Vortrag meiner „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“ (II. Aufl. S. 386–391). Die Ordnung der Acyttarien zerfällt in die beiden Unterordnungen der Einkammerigen (Monothalamia) und der Vielkammerigen (Polythalamia). Die letzteren sind besonders dadurch von großer Bedeutung, daß ihre zierlichen Kalkschalen einen großen Theil des Meeressandes und Grundschlammes zusammensetzen. Wenn dieser im Laufe von Jahrtausenden zu festem Gestein verdichtet ist und dann in Folge geologischer Vorgänge als neues Gebirge über die Meeresoberfläche gehoben wird, so erscheinen die Polythalamien-Schalen als Hauptbestandtheile der Gebirgsmassen (so z. B. im Nummulitenkalk, Miliolidenkalk u. s. w.). Die Naturgeschichte dieser gebirgsbildenden kleinen Organismen ist uns vorzüglich durch die sorgfältigen Untersuchungen des ausgezeichneten Bonner Anatomen Max Schultze bekannt geworden (Der Organismus der Polythalamien. Leipzig, 1854).

4) Unter allen Organismen dürfte die Rhizopoden-Ordnung der Radiolarien insofern als die formenreichste angesehen werden, als innerhalb derselben alle die verschiedenen geometrischen Grundformen vorkommen, die überhaupt von den Organismen gebildet werden. Die meisten dieser Kieselschalen sind durch ebenso zierliche als regelmäßige Gestalt und Architectur ausgezeichnet, und doch sind alle diese merkwürdigen Formen nur das Product formloser Urschleims oder Protoplasmas. Eine Auswahl dieser Formen enthält der Atlas von 35 Kupfertafeln, welcher meine Monographie der Radiolarien begleitet (Berlin, 1862).

5) Die Unterscheidung des neutralen Protistenreiches, welches zwischen Thierreich und Pflanzenreich mitten inne steht und wahrscheinlich zugleich die gemeinsame Wurzel dieser beiden Reiche darstellt, habe ich zuerst in meiner „Generellen Morphologie“ durchgeführt (Berlin, 1862; I. Bd.

Digitized by Google

S. 215). Später habe ich in der „Monographie der Moneren“ die Grenzen des Protistenreiches schärfer umschrieben und als vorzüglich charakteristisch für alle Protisten den gänzlichen Mangel geschlechtlicher Differenzirung und Zeugung hingestellt (Biologische Studien, I. Abschnitt). Vergl. auch den XVI. Abschnitt der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“ (II. Aufl. S. 364).

6) Das Verhältniß der Zellen zu den Cytoden und ihre Zusammenfassung als Plastiden ist am ausführlichsten erörtert in meinen „Beiträgen zur Plastidentheorie“ (Biologische Studien, II. Abschnitt). Die Natur der Zellen als selbstständiger Elementar-Organismen oder „Individuen erster Ordnung“, welche den Kern der von Schleiden und Schwann 1839 aufgestellten „Zellentheorie“ bildet, ist später vorzüglich von Brücke, Virchow und Max Schultze sehr eingehend gewürdigt worden. Vergl. namentlich Rud. Virchow: Vier Reden über Leben und Krankſein. Berlin, 1864. Vergl. ferner meine Tectologie oder Individualitätslehre (im dritten Buche der „Generellen Morphologie“ Bd. I, S. 239).

7) Die ausführliche Beschreibung und Abbildung aller bisher beobachteten Moneren enthält meine „Monographie der Moneren“ und die Nachträge zu derselben (Biologische Studien, I. und IV. Abschnitt, Taf. I—III und VI.). Kürzere Notizen darüber enthält der VIII. und der XVI. Abschnitt der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“ (II. Aufl. S. 165 und 365). Das erste Moner, dessen ganze Naturgeschichte im Zusammenhange verfolgt wurde, ist der 1864 von mir bei Nizza beobachtete Protogenes primordialis. Werthvolle Beiträge zur Naturgeschichte der Moneren (Vampyrella und Protomonas) hat außerdem besonders Cienkowski geliefert (in Max Schultze's Archiv für mikroskopische Anatomie, I. Bd.).

8) Die Frage von der Urzeugung oder Archigonie (Generatio spontanea oder aequivoca), welche schon im Alterthum von vielen Philosophen erörtert und von den consequentesten Denkern als nothwendiges Postulat der monistischen oder einheitlichen Weltanschauung hingestellt wurde, ist durch die biologischen Fortschritte des letzten Decenniums wieder in den Vordergrund gedrängt und vielfach besprochen worden. Ein früherer Vortrag dieser Sammlung hat dieselbe ausführlich behandelt (August Müller: Ueber die erste Entstehung organischer Wesen und ihre Spaltung in Arten. I. Serie, Heft 13). Daß negative Experimente nicht im Stande sind, die ganze Frage negativ zu beantworten, und daß überhaupt der Schwerpunkt der Frage nicht auf dem Gebiete der experimentellen Empirie, sondern auf dem der consequenten Philosophie liegt, habe ich in meinen Untersuchungen über Urzeugung nachgewiesen (Generelle Morphologie, 1866. VI. Capitel, S. 167; Monographie der Moneren; und Natürliche Schöpfungsgeschichte, II. Aufl. S. 301).

Digitized by Google

In demſelben Verlage erſchienen:

Ueber

die Entſtehung und den Stammbaum des Menſchengeſchlechts.

Zwei Vorträge

von

Dr. Ernſt Haeckel,
Profeſſor in Jena.

Zweite verbeſſerte Auflage.

1870. Preis 15 Sgr.

Ueber

Arbeitstheilung

in

Natur- und Menſchenleben.

Von

Dr. Ernſt Haeckel,
Profeſſor an der Univerſität zu Jena.

Mit 1 Titelbild in Kupferſtich und 18 Holzſchnitten.

1869. Preis 10 Sgr.

Druck von Gebr. Unger (Th. Grimm) in Berlin, Friedrichsſtraße 24.

Digitized by Google